

Imágenes

Hernia umbilical gigante en el siglo XXI

P. López-Lahoz, I. Gómez-Ochoa, V. Abadía-Gallego, J. Mozota, F. Lamata, M. Rivas

SERVICIO DE URGENCIAS. SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA. ZARAGOZA.

Presentamos el caso de un paciente de 65 años, soltero, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, con antecedentes de hernia umbilical de 21 años de evolución e intervenido de herniorrafia inguinal bilateral en 1991. Acude al servicio de urgencias por presentar erosiones múltiples en la pared abdominal (Figura 1) y en la extremidad inferior derecha, tras una caída. No refería dolor, alteraciones del peristaltismo ni síntomas abdominales asociados. En la inspección había un onfalocoele umbilical gigante con un paquete intestinal con "pérdida de derecho a domicilio", erosiones cutáneas abdominales y se visualizaban las asas del intestino delgado en las zonas más desvitalizadas. Se le ingresó, y se programó una colectomía subtotal con anastomosis ileosigmoidea latero-lateral y parietoplastia abdominal con colocación de una doble malla. El paciente evolucionó favorablemente durante el postoperatorio (Figura 2).

La característica más relevante de este caso es el tamaño

herniario, absolutamente excepcional en nuestro medio, y la ausencia de síntomas.

La patología herniaria supone la causa más frecuente de íleo mecánico, y deben explorarse los orificios herniarios en todo paciente con sospecha de patología abdominal. La hernia umbilical en el adulto, suele provocar dolor abdominal, alteración estética y se puede convertir en irreductible y/o estrangularse. El tratamiento de elección es la cirugía, y deben desecharse los tratamientos físicos de contención (fajas, corsés, bandas compresivas,...).

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Eryilmaz R, Sahin M, Tekelioglu MH. Which repair in umbilical hernia of adults: primary or mesh?. *Int Surg* 2006;91:258-61.
- 2- Catheline JM, Fouquet V. Hernia of the abdominal wall in child and adult. *Rev Prat* 2004;54:2281-6.

Correspondencia: Ignacio Gómez Ochoa
Camino del Buro, 225.
50011 Zaragoza.
E-mail: nachogomezchoa@yahoo.es

Fecha de recepción: 26-2-2007
Fecha de aceptación: 6-3-2007



Figura 1. Hernia umbilical gigante con “pérdida de derecho a domicilio”.



Figura 2. Una semana después de la intervención (colectomía subtotal con anastomosis íleo-sigmoidea latero-lateral y parietoplastia abdominal con colocación de una doble malla).