

Información sobre PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS COVID-19

	Presentación	Observaciones	SNG	Compatibilidad con alim/NE	Efectos adversos
Lopinavir/ Ritonavir	Kaletra® comprimidos 200/50 mg	No triturar	NO	Con o sin alimentos	Diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia
	Kaletra® solución oral 80/20 mg 60ml	Contenido en etanol y propilenglicol	SI: sin diluir. Si dilución en agua, administración inmediata . NO con sondas de poliuretano SÍ sondas de silicona o PVC	Compatible con NE	
Interferón beta-1b	Betaferon® sol inyectable 250 mcg/ml	Contraindicado en depresión grave y/o ideación suicida	-		Síndrome pseudogripal, náuseas, diarrea, linfopenia, leucopenia
	Extavia® polvo y disolv para sol iny 250 mcg/ml		-		
Interferón alfa-2b	Introna® sol iny 10 M UI		-		Mialgia, cefalea, fatiga
Darunavir/ Ritonavir	Darunavir 600 mg comp+Ritonavir 100 mg comp	Contraindicado en enfermedad hepática grave	NO	30 min después de comidas	Insomnio, alteraciones perfil lipídico, diabetes, alt gastrointestinales, astenia, prurito
	Prezista® 100 mg 7ml sol + Norvir® 100 mg sobres		SI	Compatible con NE	
Hidroxicloroquina	Hidroxicloroquina 200 mg comp	Contraindicado en presencia de alteraciones de agudeza o campo visual Vigilar glucemia	SI: dispersar en 10 ml de agua	SI	Alteraciones en la córnea (visión borrosa, fotofobia, etc), trastornos gastrointestinales cefalea
Cloroquina	Resochin® 155 mg comp (250 mg cloroquina fosfato)	Contraindicado en presencia de retinopatía o deterioro campo visual, trastornos del sistema hematopoyético y miastenia gravis	SI: dispersar en 10 ml de agua	SI	Visión anormal, trastornos gastrointestinales
Remdesivir	Remdesivir 150 mg vial IV	Se prepara en Farmacia Administración en 30-60 min Estabilidad 4h a Tª ambiente y 24 h en nevera	-	-	Hipotensión infusional
Tocilizumab*	Roactemra® 200 mg vial IV (conserv 2-8°C)	Diluir en 100 ml de SF y administrar en 1h Dilución estable 4h a Tª ambiente y 24 h en nevera	-	-	Cefalea, hipertensión, elevación ALT

*Disponible en pyxis de G01I, nevera G09D y en Farmacia